

mki-6464

by Jurnal MKI-SEANR

Submission date: 18-Nov-2020 08:53PM (UTC-0600)

Submission ID: 1450668587

File name: 6464-17104-2-ED.docx (137.27K)

Word count: 3355

Character count: 21869

Literature Review

Interventions to Reduce Anxiety in Postpartum Mother

Denis Mulanita Pratiwi¹, Sri Rejeki², Achmad Zulfa Juniarto³

¹Program Magister Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro

²Departmen Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang

³Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro

Article Info

Article History:

Key words :

Intervention, anxiety, postpartum

Abstract

Postpartum stress mostly experienced by first-time mothers. This stressful condition indicates that some new mothers experience emotional changes, sometimes feeling happy and at times almost feeling sad for no reason. This study aim to understand a deeper understanding of interventions for post partum anxiety. A literature review was conducted by looking for literatures related to the theme taken. The articles obtained were 9 quantitative studies, 7 articles from Indonesia and 2 articles from other countries. Most interventions are massage therapy and various types of relaxation (aromatherapy, hypnotherapy, yoga) to reduce the level anxiety of postpartum mothers. This review helps provide several interventions that can be carried out on postpartum mothers in a nonpharmacological, simple and effective interventions that can be carried out in postpartum mothers in reducing the level of anxiety of postpartum mothers, besides that it can improve sleep quality, reduce levels of depression, reduce stress, can increase breast milk production and increase comfort in postpartum mothers.

Corresponding author : Denis Mulanita Pratiwi
Email : denismulanita28@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam periode post partum, 85% ibu postpartum dapat mengalami gangguan psikologi. Ada yang menunjukkan gejala yang ringan dan tidak berlangsung lama, namun adapula sampai 10 hingga 15% mengalami gejala yang lebih signifikan seperti depresi atau kecemasan. Angka kejadian kecemasan pada ibu post partum secara global antara 10-15%. (Motzfeldt et al., 2013) Beberapa negara di dunia membuat laporan hanya beberapa kejadian

kecemasan post partum tetapi ada juga beberapa negara yang membuat laporan insiden yang lebih banyak (Basri et al., 2014). Menurut WHO, ibu melahirkan yang mengalami kecemasan post partum ringan diantara 10 per 1000 kelahiran yang hidup serta yang mengalami kecemasan p³² partum sedang ataupun berat diantara 30 sampai 200 per 1000 kelahiran.

Angka kejadian kecemasan lebih sering muncul dibanding dengan depresi. Kecemasan post partum serta depresi mempunyai efek pada seluruh perkembangan mental pada anak-anak yang dilahirkan. Kecemasan yang terjadi pada fase post partum penyebabnya dikarenakan terdapatnya proses perubahan peran wanita dan pria dalam proses menjadi orang tua, wanita dan pria mengalami penyesuaian diri yang sangat besar terhadap hubungan mereka dengan orang lain.

Kebanyakan ibu primipara cenderung mengalami stres post partum. Kondisi stres ini menunjukkan bahwa sebagian ibu primipara menghadapi perubahan perasaan emosional seperti merasakan bahagia tetapi juga merasakan kesedihan yang tanpa sebab di waktu yang bersamaan. Perubahan perasaan emosional ini terlihat dengan terdapatnya rasa khawatir akan perubahan perhatian dari suaminya ataupun keluarga dekat yang teralihkan dikarenakan adanya kehadiran bayi, rasa takut tubuhnya menjadi tidak ideal, rasa khawatir tidak bisa memberi ASI untuk bayinya, rasa gelisah serta kehilangan minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mempunyai rasa terabaikan oleh suaminya serta keluarga dekat, merasakan lelah serta kehilangan energi yang berkepanjangan, menurunnya konsentrasi serta kemampuan berpikir,

merasakan bersalah serta tidak berguna, dan insomnia.

Fenomena yang terjadi menunjukkan kecemasan post partum yang tidak sesegera mungkin diatasi dapat berlanjut menjadi depresi post partum yang akan membahayakan ibu dan bayinya.


Tujuan literature review ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang intervensi non farmakologis untuk mengatasi kecemasan ibu post partum.

METODE

Metode pada penelitian ini adalah *literature review*. Dalam metode ini dilakukan dengan melakukan analisis tentang intervensi yang dipergunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada ibu post partum. Database yang digunakan dalam penyusunan literature review didapatkan dari database science direct, pubmed dan google scholar. Pencarian berfokus pada judul, kata kunci dan artikel yang sesuai pada jurnal yang telah ditentukan dari tahun 2016-2020.

Keyword yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu intervensi, kecemasan dan post partum. Hasil penelusuran pada science direct 1 artikel, pubmed 1 artikel dan google scholar 7 artikel.

Gambar 1.
Algoritma Pencarian Artikel



HASIL

Penelitian Chandra Sulistyorini (2020) menunjukkan bahwa ibu postpartum yang mengalami kecemasan dalam melakukan perawatan bayi diberikan kombinasi terapi totok wajah dengan aromaterapi lavender yang dilakukan satu kali dengan durasi 15-31 menit memperlihatkan adanya perbedaan yang bermakna rata-rata skor

kecemasan pada ibu post partum sebelum serta sesudah dilakukan kombinasi terapi totok wajah dengan aromaterapi lavender (Chandra Sulistyorini, Desy Ayu Wardani, 2020).

Ridha Ariani (2018) menyatakan ibu postpartum yang tidak melakukan yoga selama kehamilan, memiliki kecemasan lebih tinggi dibandingkan dengan yang

melakukan yoga selama kehamilan yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecemasan (Ariani, 2018).

Penelitian Lutfiana Puspita Sari (2019) menunjukkan bahwa ibu nifas yang diberikan hipnosis serta rileksasi dengan cara diberikan sugesti dan melakukan visualisasi serta harapan yang diinginkan sehingga tingkat kecemasan serta stres yang dialaminya akan berkurang. Hal itu disebabkan oleh hormon kortisol yang mempunyai pengaruh terhadap stres dihambat dalam upaya produksinya dikarenakan adanya aktivasi syaraf para simpatis sehingga memproduksi hormon oksitosin serta endorpin. Ibu menjadi lebih tenang, nyaman, serta bahagia. Rileksasi pada ibu menyusui yaitu rileksasi *hypnobreastfeeding* adalah teknik rileksasi yang langsung menuju alam bawah sadar. Saat mencapai keadaan rileks yang dalam serta stabil, ibu dapat diberikan sugesti baru secara otomatis yang dapat mempengaruhi kehidupannya serta tindakannya sehari-hari tanpa sadari sehingga muncul rasa percaya diri menjadi seorang ibu serta dapat menjaga dan merawat bayinya dengan baik dengan memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi (Sari et al., 2019).

Tina Mawardika (2020) menyatakan pada saat exercise relaksasi otot progresif, fokus seseorang dipusatkan untuk dapat membedakan sesuatu yang dirasakan saat sekelompok otot dibuat lemah serta membandingkan dengan saat otot-otot dalam kondisi ditegangkan. Dengan mengetahui tempat serta merasakan otot yang tegang, maka seseorang bisa merasakan hilangnya ketegangan yang merupakan salah satu respon kecemasan yang dirasakan dengan lebih jelas, saat rasa cemas menurun, status kesehatan psikologis ibu pun meningkat sehingga berimbas pada meningkatnya status kesehatan anaknya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan bagi ibu post partum dapat memanfaatkan

relaksasi otot progresif sebagai terapi komplementer menurunkan kecemasan pada ibu post partum (Mawardika et al., 2020).

Pada penelitian Sri Rahayu (2018) menyebutkan bahwa pemberian pemijatan endorphin membantu ibu menjadi lebih segar, rileks, serta nyaman pada fase post partum. Hal ini disebabkan oleh pemberian pemijatan dapat menstimulasi tubuh untuk mengeluarkan hormon endorphin sebagai analgetik alami. Endorphin juga membuat perasaan menjadi lebih nyaman serta lebih baik sehingga dapat menurunkan kecemasan yang dirasakan oleh ibu post partum. Kecemasan ibu post partum bisa mencegah produksi colostrum, bahkan dapat juga mempengaruhi pertumbuhan bayi. Dengan dilakukan pemijatan dapat menstimulasi tubuh agar melepaskan hormon endorphin untuk mendapatkan kenyamanan (Rahayu et al., 2018).

Menurut Siti Novy Romlah (2019) menyatakan bahwa kejadian breast engorgement dapat dicegah dengan melakukan pemijatan oketani. Produksi ASI yang lancar serta tingkat kecemasan sebelum serta sesudah diberikan pemijatan oketani mengalami perbedaan. Kadar oksitosin yang meningkat serta produksi ASI yang lancar disebabkan karena adanya perasaan rileks serta kenyamanan yang didapatkan ibu setelah diberikan pemijatan oketani (Romlah and Rahmi, 2019).

Sementara itu, menurut Maryam Kianpour (2019) perbedaan rata-rata pada skor stres, kecemasan, dan depresi pasca persalinan berbeda antara kelompok studi dan kontrol pada titik waktu 2 minggu, 1 bulan, dan 3 bulan setelah melahirkan. Sehingga rata-rata skor stres dan depresi postpartum menurun melalui waktu pada wanita setelah melahirkan. Oleh karena itu, meskipun mereka biasanya menurun seiring waktu, penurunan ini lebih tinggi dengan aromaterapi lavender, yang mencegah atau mengurangi komplikasi

akibat stres, kecemasan, dan depresi pascapartum (Kianpour et al., 2016).

sangat efektif untuk menurunkan kecemasan ibu postpartum pada hari pertama (Jahdi et al., 2016).

Fereshteh Jahdi (2016) menyatakan bahwa penerapan slow stroke back massage

Table 1.
Sintesis Grid

No	Author	Title	Aim	Design of Study	Results
1	Fereshteh Jahdi et al., 2016	The effect of slow stroke back massage on the anxiety levels of Iranian women on the first postpartum day	Untuk menentukan efektivitas slow stroke back massage pada tingkat kecemasan ibu primipara di hari-hari pertama setelah kelahiran.	Single-blind randomized controlled clinical trial	Penelitian menunjukkan bahwa slow stroke back massage efektif untuk mengurangi tingkat kecemasan ibu primipara selama hari pertama pasca melahirkan
2	Maryam Kianpour et al., 2019	Effect of lavender scent inhalation on prevention of stress, anxiety and depression in the postpartum period	Untuk mengetahui efek lavender dalam pencegahan stress, kecemasan dan depresi pada ibu postpartum.	Randomized control trial	Penelitian menunjukkan bahwa rerata stress, kecemasan, serta depresi pada waktu 2 minggu post partum ($P = 0,012$, $P < 0,0001$, dan $P = 0,003$, masing-masing) dan skor stress, kecemasan, dan depresi pada waktu 1 bulan post partum ($P < 0,0001$) dan 3 bulan post partum ($P < 0,0001$) secara signifikan hasilnya lebih rendah di kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Menghirup aromaterapi lavender selama 4 minggu dapat mencegah stress, kecemasan dan depresi setelah melahirkan.
3	Chandra Sulistyorini, 2020	Efektivitas kombinasi terapi totok wajah dengan aromaterapi lavender terhadap kecemasan ibu postpartum dalam perawatan bayi	Untuk melihat efektivitas kombinasi terapi totok wajah dengan aromaterapi lavender terhadap skor kecemasan pada ibu post partum dalam melakukan perawatan bayi.	Quasi eksperimen	Hasil penelitian ini menunjukkan kombinasi terapi totok wajah dengan aromaterapi lavender efektif menurunkan skor kecemasan pada ibu post partum dalam perawatan bayi, dari

					hasil uji paired t-test didapatkan $p < 0,05$ dimana skor kecemasan sebelum intervensi 55,75 dan sesudah diberikan intervensi 50,45.
4	Ridha Ariani, 2018	Efektivitas yoga selama kehamilan terhadap penurunan kecemasan pada ibu nifas	Mengetahui efektifitas yoga selama kehamilan terhadap tingkat kecemasan ibu nifas.	True experiment	Hasil penelitian menunjukkan bahwapada kelompok yang mengikuti yoga dan tidak mengikuti yoga selama kehamilannya, memiliki perbedaan skor rerata (mean) dengan selisih 13,36. Hasil analisis data dengan Mann Whitney Test didapatkan nilai $p < 0,01$ sehingga disimpulkan yoga selama kehamilan efektif menurunkan kecemasan pada ibu nifas di BPM Eka Sri Wahyuni dan Klinik Pratama Niar Medan
5	Lutfiana Puspita Sari, 2019	Hypnobreastfeeding dapat menurunkan kecemasan pada ibu postpartum	Untuk menganalisis kecemasan dalam kelompok yang diberikan intervensi hypnobreastfeeding dan kelompok kontrol.	Completely randomized experimental design	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi hypnobreastfeeding dan kelompok kontrol terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kecemasan yang dialami, diperoleh nilai $p = 0,002$ sehingga disimpulkan bahwa hypnobreastfeeding efektif menurunkan tingkat kecemasan pada ibu postpartum.
6	Tina Ma'dika, 2020	Penerapan relaksasi otot progresif terhadap penurunan kecemasan ibu postpartum	Untuk mengetahui efektifitas relaksasi otot progresif untuk menurunkan kecemasan ibu postpartum.	Randomized Control Trial	Diperoleh hasil penelitian bahwa terapi relaksasi otot progresif efektif mengurangi kecemasan ibu nifas, ditunjukkan dengan hasil uji statistic MD (95%CI)= -10, 11, 642 dan $p = 0,02$. Menurut hasil uji statistic pada alpha

					0,05 terdapat perbedaan kecemasan ibu nifas yang signifikan pada kelompok intervensi sebelum serta setelah diberikan terapi relaksasi otot progresif (p = 0,001) dan hal ini menunjukkan bahwa terapi relaksasi otot progresif dapat menurunkan kecemasan ibu nifas
7	Sri Hanayu, 2018	Pengaruh masase endorphin terhadap tingkat kecemasan dan involusio uteri ibu nifas	Untuk menganalisis efek pemijatan endorphine terhadap kecemasan serta involusio uteri ibu post partum.	23 Quasi-experiment with a pre-post test with control group design.	28 Hasil penelitian menunjukkan sebelum perlakuan sebagian besar responden mengalami kecemasan sedang (69%), dan rata-rata tinggi uteri fundus 10,5 cm. Uji t independen menunjukkan ada pengaruh pijat endorfin tingkat kecemasan (nilai p = 0,001) dan tidak ada pengaruh terhadap involusi uterus (hal nilai = 0,302). Pijat endorphin dilakukan oleh suami kepada ibu postpartum berkontribusi sangat baik untuk menurunkan kecemasan ibu dan meningkatkan rasa kepercayaan diri.
8	Junaida Rahmi, 2020	4 Pengaruh perawatan payudara terhadap kelancaran ASI dan tingkat kecemasan pada ibu nifas	Untuk mengetahui adanya pengaruh dari perawatan payudara terhadap kelancaran produksi asi serta tingkat kecemasan pada ibu post partum	4 Quasi experiment with Two Groups Pretest-Posttest Design	Diperoleh hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan kelancaran produksi ASI sebelum serta sesudah diberikan perawatan payudara pada ibu post partum (p=0,031), serta tidak ada perbedaan tingkat kecemasan sebelum serta sesudah diberikan perawatan payudara pada ibu post partum (p value =0,278).
9	Siti Novy	Pengaruh pijat	Untuk mengetahui	Quasi	Didapatkan hasil

Romlah, 2019	2 oketani terhadap kelancaran asi dan tingkat kecemasan pada ibu nifas	pengaruh pemberian 2 pemijatan oketani terhadap kelancaran ASI dan tingkat kecemasan pada ibu post partum.	experiment with One Groups Pretest-Posttest Design	2 nelitian yaitu mean kelancaran produksi ASI sebelum serta sesudah pemijatan oketani pada ibu post partum adalah 10,3 dan 12,5, hasil uji t dependen didapatkan adanya perbedaan kelancaran produksi ASI sebelum serta sesudah diberikan pemijatan oketani pada ibu post partum (p=0,016). Mean tingkat kecemasan sebelum serta sesudah diberikan pemijatan oketani pada ibu post partum adalah 35,11 dan 13,33. Hasilnya diperoleh 2 anya beda tingkat kecemasan sebelum serta sesudah diberikan pemijatan oketani pada ibu post partum (p=0,006).
-----------------	---	---	--	--

PEMBAHASAN

Tujuan dari sistematis ini adalah mendapatkan beberapa intervensi yang bisa dipergunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada ibu postpartum. Berdasarkan analisis artikel didapatkan bahwa ada beberapa intervensi yang dapat dipergunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada ibu postpartum, antara lain : *massage therapy*, yoga, hypnoterapi, aromaterapi dan relaksasi otot progresif.

Ibu nifas memiliki emosi berlebihan yang mengakibatkan suatu perasaan cemas yang akan muncul antara kebahagiaan serta rasa nyeri yang sedang dialami. Salah satu sumber perasaan cemas yang dialami merupakan objektif ansietas primer yang muncul akibat trauma saat persalinan (*birth trauma*), yang menjadi dasar bagi terciptanya *neurotic anxiety*. Kondisi cemas dimana manusia selalu menunggu suatu hal buruk yang dapat terjadi, akhirnya manusia tersebut senantiasa ditempatkan

dalam kondisi cemas sebab memiliki rasa takut mengalami dampak yang akan buruk dalam menghadapi situasi yang tidak tentu, kondisi ini dapat dikatakan sebagai *free-floating anxiety* (Husen et al., 2017).

Pada kondisi setelah persalinan, kadar estrogen serta progesteron pada tubuh menurun, ibu terkadang merasa kelelahan setelah melahirkan serta merasakan nyeri pada perineum. Ibu dapat merasa sangat tertekan serta dapat menangis untuk hal yang tidak dipahami.

Perasaan cemas terhadap kemampuan dirinya dalam hal mengurus dan menjaga bayi setelah selesai perawatan di rumah sakit serta perasaan takut menjadi tidak menarik untuk suami adalah adaptasi psikologis yang dialami oleh ibu *post partum*. Perubahan secara tiba-tiba pada kondisi hormonal menyebabkan ibu *post partum* menjadi lebih sensitif terhadap hal yang dapat ditangani dalam kondisi normal (Husen et al., 2017).

Kecemasan adalah perasaan personal dimana terdapat reaksi secara umum atas ketidakmampuan dalam menanggapi suatu kesulitan ataupun hilangnya rasa aman yang berbentuk ketegangan mental yang membuat gelisah yang akhirnya akan memunculkan ataupun ditandai dengan perubahan fisiologis serta psikologis (Rohman, 2010). Rasa cemas adalah salah satu ketidaknyamanan psikologis yang dialami oleh ibu post partum (Yesim Aksoy Derya and Türkan Pasinlioglu, 2017).

Manajemen kecemasan non farmakologi antara lain :

a. Aromaterapi

Aromaterapi digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketidaknyamanan baik fisik maupun psikologis secara non farmakologi. Aromaterapi memiliki efek positif, sebab aroma yang menyegarkan serta harum dapat menstimulus sensori serta reseptor yang berada di hidung; lalu memberi perintah ke otak yang mempunyai control pada emosi dan memori serta memberi informasi pada hipotalamus, sebagai pengatur sistem internal tubuh, termasuk sistem seksualitas, suhu tubuh, serta reaksi terhadap stres (Rahmah and Astutiningrum, 2019). Inhalasi aromaterapi dapat menurunkan tingkat kecemasan seseorang. Tiap-tiap minyak essential aromaterapi mempunyai efek farmakologis yang unik, antara lain sebagai penenang, antibakteri, antivirus, diuretik, vasodilator, serta merangsang adrenal (Syukrini, 2016). Aroma pada *essential oil* memberi efek positif terhadap system saraf pusat, dengan menghambat pengeluaran *Adreno Corticotriphic Hormone* (ACTH) yaitu hormon yang menyebabkan terjadinya kecemasan pada seseorang (Conrad and Adams, 2012).

b. *Massage Therapy*

Massage adalah satu dari beberapa metode pilihan yang sangat safety serta mempunyai manfaat untuk pemulihan tubuh. *Massage* menaikkan produksi serotonin yang menyebabkan berkurangnya hormon kortisol, berkurangnya depresi serta dapat menyebabkan bertambahnya dopamin, berkurangnya norepinephrin serta berkurangnya rasa cemas. Membuat imunitas ibu *post partum* akan meningkat sehingga dapat mempercepat pemulihan kondisi fisik serta mental ibu (Maharani et al., 2019). Terapi pijat akan memberikan rasa rileks, lega serta nyaman secara menyeluruh pada pasien. Rileksasi dapat menekan perasaan tegang serta kecemasan yang dapat menstimulus hipotalamus (Romlah and Rahmi, 2019). Pemijatan pada tulang belakang *neuro transmitter* akan menstimulus medula oblongata untuk memberikan sinyal kepada hipotalamus di *hypofisis anterior* agar memproduksi oksitosin supaya menghasilkan air susu. Pemijatan di area tulang belakang ini dapat menurunkan ketegangan, stress hilang serta kecemasan sehingga hormon oksitosin akan diproduksi serta dapat membantu produksi air susu ibu (Suraidi, 2018)

c. Hipnoterapi

Hipnoterapi dapat membuat gelombang otak dapat sampai pada gelombang alfa, pada saat gelombang alfa mencapai otak, tubuh serta pikiran menjadi rileks, tetapi tetap waspada. Tubuh memproduksi hormon serotonin serta endorphin, yang memiliki manfaat guna menekan hormon ACTH, hormon yang mengatur sekresi kortisol yang menyebabkan stres serta cemas (Fadilah et al., 2018).

d. Yoga

Yoga mempunyai manfaat dapat meminimalkan ketegangan tubuh, pikiran, juga mental serta menjadikan tubuh lebih kuat saat menghadapi stres dan cemas, membuat rasa percaya diri meningkat,

selalu berfikir positif serta dapat meningkatkan hormon endorfin (Ariani, 2018).


e. Terapi akupuntur

Terapi akupuntur adalah salah satu intervensi komplementer guna menurunkan kecemasan serta stres.

27

Dengan melakukan penekanan pada titik-titik akupuntur yang mempunyai tujuan agar mengirimkan sinyal yang dapat menyeimbangkan system syaraf dengan memproduksi hormone endorfin untuk meningkatkan kenyamanan serta mengurangi kecemasan, stress serta rasa sakit (Sumantri et al., 2014).

Gambar 2.



SIMPULAN

Tujuan penelitian dari tinjauan ini adalah menemukan beberapa literatur-literatur yang bisa digunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada ibu postpartum dan menunjukkan berbagai macam tindakan dari berbagai intervensi yang bisa diberikan pada ibu postpartum. Tinjauan ini dapat membantu memberikan informasi tentang beberapa jenis intervensi yang dapat diberikan kepada ibu postpartum. Secara keseluruhan, tindakan non farmakologis yang dapat diberikan

sangat sederhana serta efektif dalam penurunan tingkat kecemasan pada ibu postpartum. Intervensi lainnya juga mempunyai efek meningkatkan kualitas tidur, mengurangi tingkat depresi, mengurangi stress, dapat meningkatkan produksi asi serta meningkatkan kenyamanan pada ibu postpartum.

UCAPAN TERIMAKASIH

22

Penulis memberikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan studi literatur ini.

REFERENSI

- Ariani R. Efektivitas yoga selama kehamilan terhadap penurunan kecemasan pada ibu nifas di klinik Eka Sri Wahyuni dan klinik pratama Niar tahun 2018. 2018.
- Basri AH, Zulkifli A, Abdullah MT, Basri AH, Km S. Efektivitas psikoedukasi terhadap depresi postpartum di rsia Sitti Fatimah dan rsia Pertiwi Makassar tahun 2014. *Univ Hasanuddin* 2014;1-12.
- Chandra Sulistyorini, Desy Ayu Wardani A. Efektivitas kombinasi terapi totok wajah dengan aroma terapi lavender terhadap kecemasan ibu postpartum dalam perawatan bayi. *J Med Karya Ilm Kesehat* 2020;5:1-8.
- Conrad P, Adams C. The effects of clinical aromatherapy for anxiety and depression in the high risk postpartum woman - A pilot study. *Complement Ther Clin Pract* 2012;18:164-8. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2012.05.002>.
- Fadilah WN, Megawati M, Astiriyani E. Pengaruh hipnosis terhadap tingkat kecemasan ibu post sectio caesarea. *Media Inf* 2018;14:148-53. <https://doi.org/10.37160/bmi.v14i2.214>.
- Hu¹⁹ K, Wardani ND, Puspitasari VD. Pengaruh pemberian konseling individu sebelum melahirkan terhadap tingkat kecemasan pada ibu postpartum. *J Kedokt Diponegoro* 2017;6:682-91.
- Jahdi F, Mehrabadi M, Mortazavi F, Haghani H. The effect of slow-stroke back message on the anxiety levels of Iranian women on the first postpartum day. *Iran Red Crescent Med J* 2016;18. <https://doi.org/10.5812/ircmj.34270>.
- Kia¹⁰bur M, Mansouri A, Mehrabi T, Asghari G. Effect of lavender scent inhalation on prevention of stress, anxiety and depression in the postpartum period. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2016;21:197. <https://doi.org/10.4103/1735-9066.178248>.
- Maharani K, Anwar C, Suwandono A. Kombinasi herbal steam bath dan massage terapi pada ibu nifas dalam mencegah post partum blues. *J Keperawatan Silampari* 2019;2:123-33. <https://doi.org/10.31539/jks.v2i2.509>.
- Mawardika T, Umi Aniroh¹Lestari P, Tina Mawardika, Umi Aniroh PL. Penerapan relaksasi otot progresif terhadap penurunan kecemasan ibu post partum. *J Gizi Dan Pangan* 2020;12:277-86.
- Motzfeldt I, Andreasen S, Pedersen AL, Pedersen ML. Prevalence of postpartum depression in Nuuk, Greenland - A cross-sectional study using Edinburgh Postnatal Depression Scale. *Int J Circumpolar Health* 2013;72. <https://doi.org/10.3402/ijch.v72i0.21114>.
- Rahayu S, Widyawati MN, Dewi RK. Pengaruh masase endorphin terhadap tingkat kecemasan dan involusio uteri ibu nifas. *J Kebidanan* 2018;8:29. <https://doi.org/10.31983/jkb.v8i1.3732>.
- Rahmah F, Astutiningrum D. Penerapan aromaterapi minyak sereh terhadap pencegahan gejala post partum blues pada ibu primipara di RSUD Dr. 2019:116-21.
- Rohman KL. Kesehatan mental. Purwokerto: Fajar Media Press; 2010.
- Romlah SN, Rahmi J. Pengaruh pijat oketani terhadap kelancaran asi dan tingkat kecemasan pada ibu nifas. *Eduharma J* 2019;3:90-102.
- Sar³ LP, Salimo H, Budihastuti UR. Hypnobreastfeeding Dapat Menurunkan Kecemasan Pada Ibu Post Partum. *J Kebidanan dan Kesehat Tradis* 2019;4:20-7. <https://doi.org/10.37341/jkkt.v4i1.95>.
- Sumantri, Susilowati D, Wati DK. Penurunan kecemasan ibu nifas menggunakan totok wajah di fasilitas layanan persalinan 2014;00:34-9.
- Suraidi DA. Pengaruh pijat oksitosin terhadap perubahan kecemasan pada ibu menyusui di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Malang. University of Muhammadiyah Malang, 2018.
- Syukrini RD. Pengaruh aromaterapi terhadap tingkat kecemasan pada ibu persalinan kala I di kamar bersalin Rsu Kab. Tangerang. 2019:5.
- Yesim Aksoy Derya, Türkan Pasinlioglu. The effect of nursing care based on comfort theory on women's postpartum comfort levels after caesarean sections. *Int J Nurs Knowl* 2017;28:138-44. <https://doi.org/10.1111/2047-3095.12122>.

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

garuda.ristekbrin.go.id

Internet Source

2%

2

openjournal.wdh.ac.id

Internet Source

2%

3

jurnalbidankestrad.com

Internet Source

2%

4

openjournal.masda.ac.id

Internet Source

1%

5

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

1%

6

journal.ipm2kpe.or.id

Internet Source

1%

7

R. Wesselhoeft, K. Davidsen, C. Sibbersen, H. Kyhl, A. Talati, M. S. Andersen, N. Bilenberg.

"Maternal prenatal stress and postnatal depressive symptoms: discrepancy between mother and teacher reports of toddler psychological problems", Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2020

1%

8	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Kaplan University Student Paper	1%
10	www.degruyter.com Internet Source	1%
11	Syafrida Ainur, Lucky Herawati, Melyana Nurul Widyawati. "The Benefits of Holistic Therapy for Psychological Disorders in Postpartum Mother: A Systematic Review", STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2020 Publication	1%
12	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1%
13	ircmj.com Internet Source	1%
14	Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Student Paper	1%
15	www.tangischools.org Internet Source	1%
16	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%

17

Wilda Nurul Fadilah, Meti Megawati, Endang Astiriyani. "PENGARUH HIPNOSIS TERHADAP TINGKAT KECEMASAN IBU POST SECTIO CAESAREA", Media Informasi, 2018

Publication

<1%

18

docplayer.info

Internet Source

<1%

19

sinta3.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1%

20

jik.stikesalifah.ac.id

Internet Source

<1%

21

Ike Puspitaningrum, Ani Margawati, Tri Hartiti. "METODE IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT", Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama, 2018

Publication

<1%

22

mdearthika95.blogspot.com

Internet Source

<1%

23

www.i-scholar.in

Internet Source

<1%

24

journal.stikeskendal.ac.id

Internet Source

<1%

25

onlinelibrary.wiley.com

Internet Source

<1%

26

journals.lww.com

Internet Source

<1%

27

I Wayan Subrata, Dariyo Dariyo Utomo, I Wayan Budi Utama. "PENANGANAN PENYAKIT PIKIRAN PADA KLINIK PURI USADHA DI KOTA DENPASAR PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN", Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, 2019

Publication

<1%

28

Puji Astutik, Eka Kurlinawati. "Pengaruh Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea", STRADA JURNAL ILMIAH KESEHATAN, 2017

Publication

<1%

29

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

<1%

30

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1%

31

Hera Hijriani. "Pengaruh Psychoeducational Parenting terhadap Kecemasan Orang Tua yang Mempunyai Anak Penyandang Thalassemia Mayor", Jurnal Keperawatan Silampari, 2018

Publication

<1%

32

pasca.unhas.ac.id

Internet Source

<1%

33

Fereshteh Jahdi, Maryam Mehrabadi, Forough Mortazavi, Hamid Haghani. "The Effect of Slow-Stroke Back Massage on the Anxiety Levels of Iranian Women on the First Postpartum Day", Iranian Red Crescent Medical Journal, 2016

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On